



Tropical Fruit Factsheet

Sapodilla

Authors: Jeff Wasielewski, Laura Vasquez and Jonathan H. Crane

Common name: Sapodilla

Botanical name: *Manilkara zapota*

Family: Sapotaceae

Good varieties: Alano, Makok, Hasyá, Morena and Tikal

About the fruit: Underneath their dull brown exterior is an extremely sweet pulp tasting similar to brown sugar. Much like its cousin the mamey, it is hard to tell when this fruit is mature and ready to pick without nicking the skin of the fruit to look for a tan or tannish-green color. If the nicked spot is still green, the fruit is not mature (ready to pick).

Season: Main season is December through June.

Why you should consider it: Most varieties are heavy producers and can have fruit for several months of the year.

Be aware: There are some caterpillars that attack the bloom and fruit. The tree also has a lot of latex which can gum up your tools while you are picking the fruit or pruning the tree.

Pruning: This tree should be kept at fifteen feet or less through annual selective pruning. Some cultivars are difficult to prune due to their upright branch structure. Remove strong verticals and encourage lateral growth.

Planting: Make sure not to plant too deep. Dig the hole bigger than the container but refill the hole with the native soil so the plant's first flare root is at or just above ground level. Protect the tree from mechanical damage (string trimmers and mowers).

Fertilizer: Use an 8-3-9 or something similar two to three times during the rainy season (May to October). Drench with chelated iron (EDDHA) and use a micro-element foliar spray two to three times from May to October.

Un Vistazo a la Fruta Tropical

Chicozapote

Por: Jeff Wasielewski, Laura Vásquez y Jonathan H. Crane

Nombre común: chicozapote

Nombre botánico: *Manilkara zapota*

Familia: Sapotáceas

Variedades recomendables: Alano, Makok, Hasyá, Morena y Tikal

Acerca de la fruta: Debajo de su exterior color café opaco hay una pulpa extremadamente dulce con un sabor similar a la azúcar morena. Al igual que su primo el mamey, es difícil saber cuándo esta fruta está madura y lista para cosechar sin cortar la piel de la fruta para buscar un color almendra o verde almendra. Si el punto del corte todavía está verde, la fruta no está madura (lista para cosechar).

Temporada: La temporada principal es de diciembre a junio.

Por qué debería considerarlo: La mayoría de las variedades son grandes productoras y pueden tener fruta durante varios meses del año.

Tome en Cuenta: Hay algunas orugas que atacan la flor y la fruta. El árbol también tiene una gran cantidad de látex que puede atascar sus herramientas mientras recolecta la fruta o poda el árbol.

Poda: Este árbol debe mantenerse a 15 pies o menos mediante una poda selectiva anual. Algunos cultivares son difíciles de podar debido a la estructura de sus ramas verticales. Elimine las verticales fuertes y fomente el crecimiento lateral.

Plantar: Asegúrese de no plantar demasiado profundo. Cave el hoyo más grande que el contenedor, pero vuelva a llenar el hoyo con suelo nativo para que la primera raíz acampanada de la planta esté al nivel del suelo o justo por encima. Proteja el árbol de daños mecánicos (cortadora de malezas y cortadora de césped).

Fertilizante: Use un 8-3-9 o algo similar dos o tres veces durante la temporada de lluvias (de mayo a octubre). Empape con hierro quelado (EDDHA) y use un rocío foliar de microelementos dos o tres veces de mayo a octubre.

